

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ

ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.

ЧАСТЬ V. No 2.

*Discere ne cessa: cura sapientia crescit:
Rara datur longo prudentia temporis usu.*

О д ѣ о.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФІИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТ. ВНУТ. ДѢЛЪ.

1825 ГОДА.

IX.

ОПИСАНІЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БОЛѢЗНИ (*Rarhania*), ВЫВШЕЙ ВЪ МѢСТЕЧКѢ ВЫШКАХЪ ВЪ 1824-МЪ ГОДУ.

Динабургскаго Уѣзнаго Лѣкаря Доктора Медицины *Ясюковича* (*).

Минувшаго 1824 года въ послѣднихъ числахъ Декабря, при частыхъ перемѣнахъ атмосферы влажной, въпрямь восочно-сѣвернымъ и западнымъ колеблемой, оказалась болѣзнь въ мѣстечкѣ *Вышкахъ* между Евреями обоого пола, разнаго возраста и лѣтъ. Изъ числа больныхъ большая часть, особливо молодыхъ людей, пошчасъ занемогли проспудною аспенической горячкою, и въ людяхъ возмужа-

*) Сообщено Исправляющимъ должность Гражданскаго Генераль-Шпабъ-Доктора Г-мъ Снапскимъ Совѣшникомъ Гаевскимъ.

*

дыхъ лѣтъ болѣзнь сія начиналась подъ видомъ ломотной горячки, съ болью какъ бы въ костяхъ, ознобомъ, жаромъ, между собою перемежающимися, съ непріятнымъ чувствомъ въ спинѣ, производимымъ какъ бы ползающими мурашками, и съ сильною болью въ поясницѣ; а у другихъ обнаруживалась она слабымъ воспаленіемъ какого нибудь органа, или же только проспудною горячкою, съ большимъ пораженіемъ спины соединенною; на 6-й и 7-й день при высшупленіи малаго поппа появлялись шоска, уныніе, большая слабоспъ, боль въ поясницѣ и спинѣ, бредъ, подергиваніе сухихъ жилъ, разслабленіе мышницъ, сжимающихъ задній проходъ, корчи въ икрахъ, парализъ нижнихъ конечностей, поносъ, икота, *Facies hippocratica*; напоследокъ всѣ сіи жестокіе припадки оканчивались смерпію.

Въ чувствительныхъ особахъ, дѣтяхъ и женщинахъ нѣжнаго сложенія, а больше между шѣми, копорые въ малыхъ хижинахъ при многочисленномъ семействѣ вмѣспѣ съ больными находились, болѣзнь сія обнаруживалась сильнѣйшею слабоспію, болью въ поясницѣ и по всей хребтовой кости, спягиваніемъ брюха, спѣсненіемъ въ груди, голово-

круженіемъ, судорогами, особенно поражающими нижнюю лѣвую конечность, копорая какъ бы изъ своего мѣсца выдергивалась; при каковомъ состояніи больные имѣли малую жажду, или большое желаніе пиши, не ушюляя вовсе онаго.—Пульсъ былъ слабый, малый и нерегулярный; изъ числа 48-ми больныхъ, спрадавшихъ описываемую болѣзнію, у одного 17-ши лѣшняго юноши появился сухій аншоновъ огонь, занявшій всю спшопу, копорый обнаружился слѣдующими признаками: при оказавшейся большой слабости съ чрезмѣрною спшужею во всей спинѣ, поясницѣ и ногахъ, *cum facie terestri lurida*, съ подергиваніемъ пальцевъ въ нижнихъ и верхнихъ конечностяхъ, появилось малое черное пятно, копорое, распроспраняясь скоро, заняло всю спшопу лѣвую, и больной въ скоромъ времени умеръ.

При Анапомико-Пашологическомъ изслѣдованіи умершихъ опшъ сей болѣзни находилъ я водянистое изліяніе около начала спшановой жилы, печень чрезмѣрно красною, по поверхности копорой разсѣяны были синія пятна, кровеносныя жилы и правый желудочекъ сердца наполненными жидкою кровію, спшано-

вая жила около поясничныхъ позвонковъ въ сущесствѣ своемъ была измѣнена и казалась чрезмѣрно разслабленною и нѣсколько сжатою.

Предрасполагающими причинами къ сему бѣдспвію полагають должно самое мѣспоположеніе мѣспечка *Вышекъ*, низкое, болошисное, съ шрехъ споронъ озерами окруженное; частыя перемѣны сырой, влажной и въпренной погоды, бѣдспвенное сосстояніе Евреевъ, переселившихся изъ сель и деревень и спѣсненныхъ по нѣскольку семейспвъ въ малыхъ хижинахъ, скудная пища, худая одежда; сему способспвовало шакже чувспвишельное и нѣжное сложеніе и возрастъ младенченскій.

Случайною причиною почишаю я хлѣбъ, упошребляемый въ пищу, копорый испышывая нашель, что онъ пригошовленъ изъ ржаной муки, имѣющей въ себѣ чрезмѣрное количеспво *терныхъ рожковъ* (*Secale cornutum*), ошъ кошорыхъ испеченный хлѣбъ имѣеть черный цвѣтъ и горькій вкусъ. Касашельно предсказанія заключають было можно, что болѣзнь сія могла бы имѣть опущошиспельныя слѣдспвія, если бы помощь Врача и благоразумныя распоряженія не были предпріяшты.

Изъ числа 48 больныхъ 16 человекъ умерло, часпю по жестокости самой болѣзни, часпю попому, что помощь Врача, при умноженіи больныхъ въ скоромъ времени и пропущеніи срока самыми больными, для нѣкошорыхъ не могла бытъ спасительнымъ средствомъ.

Что касается до исхода сей болѣзни, то больные, одержимые оною, выздоравливали скорѣе при слѣдующихъ обстоятельствахъ: младенцы, имѣющіе глисты и женщины предъ открытіемъ мѣсячнаго очищенія, по видимому, спрадали гораздо больше сею болѣзнію; но при выходеніи у первыхъ глистовъ, а у вторыхъ при открытіи мѣсячнаго очищенія болѣзнь сія имѣла хорошій исходъ, и больные вскорѣ выздоравливали. У субъектовъ, имѣющихъ колпуны, жестокость припадковъ была сильнѣе, какъ шо: чрезмѣрная боль въ поясницѣ, судороги и корчи въ нижнихъ конечностяхъ, и изъ нихъ больше умирало, а ежели кто и выздоравливалъ, шо слѣдствиемъ онаго зла оспавалась на время слабость, непріятное сжиманіе въ брюхѣ около пупка, а нѣкошорые изъ мужчинъ спрадали *pollutione et impotentia virili*.

Помощь со стороны моей основывалась на слѣдующихъ условіяхъ: 1-е, ограничить жестокость распространенія болѣзни; 2-е, удалить предрасполагающія и случайныя причины; 3-е, укротить жестокость болѣзни; 4-е, поддерживать, жизненныя силы и произвести хорошее окончаніе. На сей конецъ больные отдѣлены были въ особыя, пространныя и къ дѣченію удобныя комнаты, которыя освѣжаемы и окуриваемы были укусомъ. Рожь, употребляемая въ пищу и имѣющая *vesale cognatum*, пересѣиваніемъ, вывѣшриваніемъ и мышіемъ была очищаема; мука, пригошовленная изъ шаковой ржи, была воспрещена къ употребленію въ пищу. Больные употребляли въ пищу расщипельные плоды, а въ пицѣ, состоящее изъ воды, прибавляемы были: подслащенный медомъ укусъ и малое количество виннощелочной соли, или же, въ продолженіи болѣзни, отваръ маковыхъ головокъ; какое питье способствовало къ удобному испражненію нечистоты желудка и къ облегченію судорожныхъ припадковъ; когда же нечистоты отъ употребленія сего питья не испражнялись и больные не получали облегченія въ своихъ припадкахъ,

иногда употреблялъ я рвотное, состоящее изъ ипекакуаннаго корня и виннощелочной соли въ большихъ приемахъ, а меньше чувствительнымъ давалъ рвотное изъ крахмала и виннощелочной соли; присемь должно замѣтить, что у шѣхъ больныхъ, у которыхъ судорожные припадки должны были появиться, также и у шѣхъ, которые спирадали глистами, по употребленіи рвотнаго, или даже безъ онаго, появлялись рвота, судороги, головокруженіе, послѣ чего корни и самая болѣзнь ожесточались. Посему лѣченіе оныхъ начиналось употребленіемъ *Anthelminticum* въ слѣдующемъ видѣ: R. *Spigeliae anthelminticae*, *Radicis valerianae* off aa ʒj. *Seminum Santonici* ʒjij. Infunde sufficienti quantitate aquae communis Colatur ʒ x, adde *Tartratis stibii et potassae gran. dimidium*, *Oxymellis Simplicis* unc. unam. M. D. S. Cap. omni hora duo cochlear. mensualia.

Людямъ крѣпкаго сложенія, одержимымъ воспаленіемъ какого нибудь органа, сначала дѣлаемо было небольшое кровопусканіе, приспавляемы пѣвки, и даваемы были слабительныя на 5 или 7-й день; попогонныя средства, наспойка бузиновыхъ или лимповыхъ

цвѣшовъ съ Миндереровымъ спиршомъ, изъ ароматическихкихъ шравъ примочки и шреніе камфорнымъ спиршомъ для облегченія боли спины были пакже упошребляемы. При шаковомъ врачеваніи, ежели у нѣкошорыхъ въ сіе время вмѣсто благопріятнаго рѣшенія болѣзни появлялись уныніе, большая слабость, бредъ, корчи или разслабленіе сжимающихъ проходъ мышциъ, въ шакомъ случаѣ лихорадочная корка, наспойка изъ Виргинскаго змѣевика или мауннаго корня съ прибавкою маковаго или померанцоваго сиропа были упошребляемы; шаковыя средсшва доспавляли покой и поддерживали силы; у нѣкошорыхъ на 12 или 21-й день слѣдовали хорошія кришическія испражненія чрезъ мочевые пуши; причемъ моча испражняема была мушная, съ осадкою кирпичнаго цвѣша. Послѣ сего спраждушіе примѣпно и мало помалу получали возвращеніе силъ и самое здоровье.
