

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

**МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ
ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.**

~~~~~  
**ЧАСТЬ XXV. No. 2.**  
~~~~~

**Discere ne cessa: cura sapientia crescit:
Rara datur longo prudentia temporis usu.**

Cato.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ИВЕРСЕНА.

1835 ГОДА.

I.

КРАТКОЕ ИЗВѢСТІЕ de *Raphania epidemica*
ОКАЗАВШЕЙСЯ, ВЪ ПРОШЛОМЪ 1854 ГОДУ,
ВЪ НѢКОТОРЫХЪ УѢЗДАХЪ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНІИ
И ВЪ ЗЕМЛѢ ДОНСКАГО ВОЙСКА.

Извлечено изъ должностныхъ донесеній
мѣстныхъ Начальствъ по Управленію Г-на
Гражданскаго Генераль-Штабъ-Доктора.

Сообщ. Професс. *Спаскиль*.

А.) Въ Вятской Губерніи оказалась *Rhaphania* въ уѣздахъ: Елабужскомъ, Малмыжскомъ и Сарапульскомъ. Г-нъ *Чудновскій*, Сарапульскій уѣздный Врачъ, въ донесеніи Г-ну Вятскому Гражданскому Губернатору, описываетъ сію Эпидемію такимъ образомъ: опасная, не рѣдко смертельная, не щадящая ни пола, ни возраста, судорожная болѣзнь, оказавшаяся нынѣ въ Сіаг-зюмьинской волости (Сарапульскаго уѣзда), есть такъ назы-

ваемая *злая корча* (*Rhaphania, Spasmus cerealis, Ergotismus*). Она происходитъ отъ употребле-
 бленія въ пищу ржаного хлѣба, содержащаго
 въ себѣ черные рожки, именуемые въ про-
 спорѣчїи *спорынъею*, или *бабыль зуболь*, а
 по - Волякски: *ульъ*. Эти рожки суть бо-
 лѣзненное измѣненіе зеренъ ржи въ темно-
 фіолетовыя, довольно крупныя, нѣсколько ис-
 кривленныя и, по своему свойству, ядовитыя
 зерна. Въ нынѣшнемъ (1834) году уродилось
 весьма много рожковъ въ означенной волости;
 къ чему, сверхъ низкаго и болошисаго ея
 мѣсположенія, въ особенности способство-
 вали частые дожди, бывшіе лѣтомъ и
 осенью.

Болезнь обнаруживалась слѣдующими при-
 падками: больной въ началѣ чувствовалъ
 скоро проходящую слабость, къ которой, въ
 непродолжительномъ времени, присоединилось
 подергиваніе въ конечностяхъ. За симъ слѣ-
 довали: головная боль, тошнота, рвота, пу-
 ченіе живота, одеревѣніе конечностей, по-
 добное тому, которое бываетъ, когда кто
 пересидитъ ногу. Это одеревѣніе скоро
 переходило въ онѣмѣлость и корчи конечно-
 стей; причемъ руки сводило въ локтяхъ, въ

киспяхъ и въ пальцахъ , а ноги въ колѣнахъ , въ составѣ бедра со сполною и въ пальцахъ ; иногда все шло сгибало въ дугу. Эти корчи у однихъ повпорялись ежедневно , у другихъ чрезъ два или три дня , но всегда съ возра- спающею жестокостію. Въ корчевомъ при- ступѣ больные испускали пронзительный крикъ , или глухой стоиъ. Языкъ у нихъ нѣмѣлъ ; глаза , безъ всякаго выраженія , безъ миганія , устремлялись неподвижно на пред- стоящій предметъ. Дыханіе почти прерыва- лось , или происходило съ большимъ трудомъ. Въ такомъ состояніи , новый приступъ су- дорогъ , или апоплексическій ударъ , прекра- щали жизнь спрадальца. На смертельный ис- ходъ болѣзни имѣло вліяніе колючество хлѣ- ба , употребленнаго въ пищу. Остававшіеся въ живыхъ перпѣли опъ послѣдствій сей болѣзни. Къ паковымъ опнесши должно : слабостъ душевныхъ и шѣлесныхъ силъ , па- ралишическое состояніе рукъ и ногъ и паду- чую болѣзнь. Случалось , что человекъ , по видимому , совершенно выздоровѣвшій , уже по прошествіи значительнаго времени , поражал- ся апоплексическимъ ударомъ , или умиралъ въ приступѣ падучей болѣзни. Даже домаш-

нія живошныя околъвали опъ употребленія хлѣба съ рожками.

Г-нъ Ч. совѣщуетъ, сколько возможно, осерегаться опъ употребленія хлѣба съ рожками и предлагаетъ строго исполнять предохранительныя мѣры. Мѣры сіи, извѣсныя Врачамъ изъ Медицинской Полиціи, изложены имъ обстоятельно.

»Леченіе больныхъ, говоритъ Г-нъ Ч., производился мною, а въ случаѣ моей оплучки, по дѣламъ службы, спаршимъ Лекарскимъ ученикомъ, по даннымъ опъ меня наспавленіямъ.« Весьма жаль, что онъ не сказалъ: въ чемъ именно состояло это леченіе.

В Ъ Д О М О С Т Ъ

о дѣйствіи болѣзни, именованной *злою корьею*,
въ Малмыжскомъ уѣздѣ, съ 18 Октября
по 6 Ноября 1834.

Названіе селеній.	Къ 18 Октя- бря о- снова- лось болѣ- ныхъ.	Вновь при- было.	Вы- здоро- вало.	Умер- ло.	Оста- валось болѣ- ныхъ по 6 Ноя- бря.
Николаевской во- доспи:					
въ Починкѣ Ипы- лызвѣ	10	1	5	4	5
Ягуль-Можгѣ	6	—	4	1	1
надъ Каменнымъ Ключемъ	5	—	5	—	—
Ураскозь-Можгѣ . .	5	—	4	1	—
Большой Дѣрки . .	5	1	1	2	3
Итого:	31	5	19	8	9

Изъ сей вѣдомости видно, что болѣзнь,
къ 6 Ноября, прекратилась въ Починкѣ, надъ
Каменнымъ Ключемъ, въ Ягуль - Можгѣ и

Ураскозь-Можгъ. Изъ дальнѣйшихъ донесеній, оказывающагося, что 9 человекъ больныхъ, оставшихся къ 6 числа Ноября, въ течение двухъ дней выздоровѣли, и болѣзнь прекратилась.

Въ Елабужскомъ уездѣ появилась *Злая корка* въ началѣ Ноября 1834. Въ деревнѣ Большой Пудгъ, въ 5 семействахъ, умерло 12 человекъ; больныхъ, къ 11 Ноября, оставалось 6, а выздоравливающихъ 3 человека. Къ 29 Декабря оставалось въ Елабужскомъ уездѣ всего 2 больныхъ; вновь заболѣвшихъ не было.

Б.) Донецкаго округа, въ землѣ войска Донскихъ Казаковъ, въ поселкѣ Рудаковомъ-Лиховскомъ, въ исходѣ лѣта прошлаго 1834 года, оказалась болѣзнь, признанная, командированнымъ отъ Донскаго сыскнаго Начальства Штабъ-Лекаремъ *Милаховымъ*, за анпоновъ огонь. Женщина, первозаболѣвшая сею болѣзнію, умерла; а два мальчика и одна женщина оставались пораженными ею. По поводу сего донесенія, Старшій въ войскѣ Донскомъ Медикъ Г-нъ *Ланге* и четыре другихъ Врача заключали, что появившаяся болѣзнь есть сухой анпоновъ огонь, sospa-

вляющій опшлічіе злой *кочви* (Rharphania). Для подробнаго изслѣдованія сей болѣзни и причинъ, ее произведшихъ, отправленъ былъ Медико - Хирургъ *Божковскій*. Довесеніе его изъ поселка Лиховскаго подтвердило предположеніе Врачей. Онъ нашелъ язмъ прехъ больныхъ (*), кои дѣйствительно были одержимы сухимъ антоновымъ огнемъ (Gangtaera zissa s. Neogosis ustilaginea). Болѣзнь, говоритъ онъ, оказалась у нихъ въ концѣ Іюля и въ началѣ Августа мѣсяца, и есть вовсе неприлипчива. Причину появленія болѣзни приписываетъ Г-нъ *Б.* наипаче употребленію хлѣба съ рожками. Општы больныхъ и окружавшихъ ихъ были, по словамъ его, неудовлетворительны и сбивчивы. Изъ числа троихъ больныхъ двое, 20-ти лѣтн. женщина и 9-ти лѣтн. мальчикъ, весьма спрадали опъ боли и бессонницы; эти припадки часно доводили ихъ до безумія и бреда.

Въ поселкѣ Куряковомъ-Липовскомъ нашелъ Г-нъ *Б.* семь человекъ, одержимыхъ

(*) Женщину 20-ти лѣтъ и двухъ мальчиковъ: одного 9-ти, а другаго 11-ти лѣтъ.

сухимъ аншоновымъ огнемъ (*). Вся заболѣли въ концѣ Іюля и въ началѣ Августа мѣсяца.

Ходъ болѣзни былъ здѣсь такой же, какъ и въ поселкѣ Лиховскомъ. Здѣшніе крестьяне, выходцы изъ Русскихъ Губерній, яснѣе выражали свои спраданія и лучше помнили предварительные или первоначальные припадки, копорые оказывались не у всѣхъ одинаково. Обыкновенно вскорѣ по употребленіи пищи, въ особенности сыромолочнаго хлѣба съ рожками, они ощущали боль и рѣзь въ животѣ и слабость во всемъ тѣлѣ; поднявъ руку или ногу было тягостно; нерѣдко при семъ дѣлалась пошнота и рвопа. Наѣвшисъ такого хлѣба, чувствовали только полную

(*) Эти больные были: 1) *Прасковья Зайцова* 21 года, она лишилась всѣхъ пальцевъ на лѣвой рукѣ; 2) *Максимъ Яргенко* 40 лѣтъ, у коего обѣ руки поражены были аншоновымъ огнемъ по локопѣ; 3) Жена сего послѣдняго *Прасковья*, одержимая сильною нервною горякою, съ омертвѣніемъ лѣвой руки по локопѣ; 4) *Семенъ Савинъ* 45 лѣтъ, съ омертвѣніемъ лѣвой руки; 5) *Илія Зайцовъ* 25 лѣтъ; 6) *Петръ Колпаковъ* 38 и 7) *Авдотья Кослянинова* 40 лѣтъ, у коихъ болѣзнь была еще въ началѣ безъ омертвѣнія членовъ.

въ желудкѣ безъ насыщенія. Въ послѣдствіи у иныхъ оказывалась послабляющая горячка, у другихъ же ее не было, а замѣчался шумъ въ головѣ. У вѣкошорыхъ, за продолжительнымъ употребленіемъ означеннаго хлѣба, безъ предварительныхъ припадковъ, являлась колючая боль въ пальцахъ рукъ или ногъ; чему, у весьма немногихъ, предшествовало чувство ползанія муравьевъ въ пораженной части (*sensus formicationis*): Эта часть ошѣмѣвала и дѣлалась холодною, безъ всякихъ наружныхъ признаковъ и явственнаго распрѣйства въ отправленияхъ организма. Сказанная боль, постепенно увеличиваясь, продолжалась отъ одной недѣли до двухъ мѣсяцевъ. Помимо показывалась едва примѣтная припухлость члена красновапаго цвѣта, переходившаго въ послѣдствіи въ синій; пораженная часть болѣе и болѣе холодѣла. Если верхнія конечности поражались антоновымъ огнемъ, то больные имѣли чувство сильнаго холода между лопашками; тѣ же, у кошорыхъ антоновъ огонь долженъ былъ оказаться на нижнихъ конечностяхъ, жаловались на сильный холодъ въ нижней части позвоночнаго столба; при семъ, у весьма немногихъ, являлись судорги

въ краяхъ и по небольшимъ. На означенной припухлости, на пальцахъ рукъ и ногъ, близь пальцевъ или между пальцами, дѣлался пузырь, наполненный сукровицею; по вскрытіи коего видно было помершвѣлое, нечувствительное тѣло. Помершвѣніе, съ жестокими болями, шло далѣе и далѣе. Кожица сходила съ пораженныхъ частей; онѣ были черны какъ уголь и опдѣляли, въ небольшомъ количествѣ, жидкость, на сукровицу похожую (ichor). Синягровая краснота, съ небольшою припухлостію, окружала помершвѣніе; она болѣе распространялась вверхъ; отъ нажиманія перспомъ оставалось на ней, на короткое время, бѣлое пятно. Если англоновъ огонь сильно распространялся, тогда замѣчалось *нѣчто похожее* на febris nervosa stupida. И здѣсь болѣзнь сія была совершенно неприличива. Причину болѣзни, и въ семь посѣдкѣ, приписываетъ Г-нъ В. въ особенности употребленію муки изъ нездорѣлой, сыро-молодой ржи, смѣшанной съ рожками и другими вредными веществами. Рожковъ и здѣсь родилось множество.

Если болѣзнь находилась на низшей степеніи своего развитія, то больные выздоравли-

вали; часпъ же пораженная анпоновымъ огнемъ оспаивалась безвозвратпо поперянною. Если анпоновъ огонь занималъ весь какой-либо большой членъ, наприм. руку выше локтя, или ногу выше колъна, по больной умиралъ въ припадкахъ нервной горячки.

Г-нъ Б. замъчаетъ, что больные ею и мъли языкъ чистый и влажный, а жажды почти не чувствовали. Въ печеніе болъзни не усматривалось у нихъ засоренія первыхъ путей; тошнота, рвота и боль въ желудкѣ оказывались только вскорѣ по употребленіи хлѣба съ рожками. Пульсъ былъ малый, едва ускоренный, а у нъкоторыхъ перемежающійся. Судороги едва были замътны и по въ краяхъ только.

Способъ леченія, оказавшійся полезнѣйшимъ, состоялъ въ употребленіи укръпляющихъ и возбуждающихъ средствъ, к. ш. corticis peruviani, radicis ascori salami, настольныхъ въ водкѣ, съ ароматными, горькими кореньями и горчицей. Снаружи превосходно помогало отдѣленію помертвѣлыхъ частей кислое ржаное шъсто, смъшанное съ кровкимъ хлѣбнымъ уксусомъ и усыпанное мълкомъ; омываніе члена дълалось, при всякой

перевязкѣ , крѣпкимъ уксусомъ , смѣшаннымъ съ горячимъ виномъ. Перевязка , замѣчаешь Г-нъ *В.* , должна была производиться не менѣе чепырехъ разъ въ сутки. Язва , остававшаяся по опредѣленіи помершвѣлыхъ частей , — кон опходили безъ боли и кровопеченія , — была лечима , какъ простая , чистая рана. Regimen diæticum имѣлъ большое вліяніе на успѣшный ходъ сей болѣзни , и не рѣдко приостанавливала развитіе ея , если больной могъ заблаговременно пользоваться здоровою пищею. Приличная діѣта , при наружномъ и внутреннемъ употребленіи водки , настольной горчицей , явно приносила пользу въ первомъ періодѣ болѣзни , когда еще не оказывалось помершвѣніе , а части только терпли и холодья. Само собою разумѣется , заключаешь Г-нъ *В.* , что рвотныя и слабительныя были бы употреблены , если бы оказались нечистоты въ первыхъ путяхъ , или замѣчены были остатки неперевавшейся пищи ; но поелилику , въ настольцемъ положеніи болѣзни , ни у одного больного не видно было никакихъ слѣдовъ засоренія желудка и кишечнаго канала , напрошивъ у всѣхъ были явственны слабость и истощеніе организма , по и не

настало надобности въ означенныхъ средствахъ.

Въ слободѣ Шепшуховкѣ, вѣдомства Донецкаго же округа, нашель Г-нъ *Б.* (14 Октябля) двухъ больныхъ мужскаго пола, одного 28 и другаго 55 лѣтъ. У перваго поражена была сухимъ аншоновымъ огнемъ правая рука по докошь, а у втораго кисть лѣвой руки. Болѣзнь была таково же свойства и происхожденія, какъ и въ поселкахъ Рудаковомъ и Курнаковомъ.

Всѣ помѣщики Донецкаго округа были повѣщены мѣстнымъ Начальствомъ какъ о самой болѣзни и мѣрахъ предосторожности, какъ и о способахъ оидѣлять сѣмена ржи отъ рожковъ по наставленію, предложенному Дѣйствительнымъ Спашскимъ Совѣтникомъ *Мухинымъ*, по случаю подобной болѣзни, оказавшейся, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи, въ 1821 и въ 1822 годахъ.

Изъ донесенія мѣстнаго Начальства, отъ 16 Января 1835 года, видно, что сухой аншоновъ огонь, въ землѣ Войска Донскихъ Козаковъ, уже нигдѣ болѣе не оказывался. Изъ 12 человекъ больныхъ, заболѣвшихъ прежде въ разныхъ поселкахъ, ни

одинъ не умеръ по означенное время, въкопирые уже выздоровѣли, а другіе приближались къ выздоровленію.

Post-scriptum Профессора Спасскаго.

Въ извѣстномъ отвѣсѣ Марбургскаго Факультета (*) *Raphania* (**) счищается болѣзнію новою и Древнимъ неизвѣстною; но она могла являться и прежде при тѣхъ обстоятельствахъ, которыя способствуютъ ея происхожденію въ наше время. Древніе безъ сомнѣнія знали объ ней. *Галенъ* (***) объ ней упоминаетъ; однакожь первыя, обстоятельныя свѣденія сообщилъ объ ней *Швенкфельдъ* въ 1558 году (De morbo epidemico spasmodico

(*) De convulsione cereali epidemica, novo morbi genere, facultatis medicæ Marburgensis responsum. Libellum primum, rarum et argumento gravem, recudi curavit notulisque auxit *Christ. Godofr. Gruner.* Jena. 1795. 8.

(**) Правильнѣе *Raphania*. Synom. *Morbus cerealis* Jos. Frank. *Morbus convulsivus malignus et epidemicus, Necrosis ustilaginea* Sauvag. *Convulsio Soloniensis, Malum Soloniense, Convulsio dolorifica* Darwin. *Myrmekiasis* Swed. *Convulsio cerealis* Baldinger. *Eclampsia typhod.* Sauvag.

(***) *Raimann*, Speciel. Pathologie und Therapie. II. Bd. 1831. §. 1460.

in montibus Silesiæ sæviente). Съ тѣхъ поръ описаны многія эпидеміи сей болѣзни. Эпидемія, бывшая въ первой половинѣ 18 столѣтія во Франціи (въ Солоньи — *Malum Soloniense*), замѣчательна смертносщью: изъ 120 больныхъ едва пятеро выздоравливали (*),

Болѣзнь имѣетъ неприличное названіе, *Raphania*, данное *Линнеемъ* (**), полагавшимъ причину ея въ употребленіи кляба, смѣшаннаго съ полевою редькою (*Rhaphanus Raphanistrum*). »*Quem cum ill. Linnéa simplici Raphaniæ nomine insignire placet, non quidem, ut causam ejus efficientem talem esse credam, qualem is reperisse sibi visus est; sed, ut brevissime saltem et uno verbo morbum appellare possim.*» *R. A. Vogel*, *Academ. prælection. §. 493.*

Raphania оказываеся въ двухъ видахъ (***), изъ коихъ одинъ имѣетъ ходъ хроническій и

(*) *G. F. Most Encyclopädie der gesamt. medicin. und chirurg. Praxis. 1834, VII. Heft. Raphania.*

(**) *Diss. de Raphania. Upsal. 1763. In Amoen. Acad. Vol. VI.*

(***) *Fuchs's Syst. d. Medicin II. Th. 1. Bd. 1897. §. 111. и слѣд. Conradi Speciel. Patholog. und Therap. II. Bd. 1833. §. 1427 и слѣд. Raimann Speciel. Pathologie und Therapie, II. Bd. 1831. §. 1460 и слѣд. Most въ прив. соч. Raphania.*

обозначенъ корчами (*Convulsio cerealis*); другой же сопровождается нервною горячкою (*F. peruvosa stupida*) и замѣчается сухимъ анпноновымъ огнемъ (*Necrosis ustilaginea, Malum Soloniense*; по Франц. *Ergot, l'ergotisme gangréneux*).

Сущность болѣзни состоитъ въ особенномъ пораженіи узловатыхъ нервныхъ сплетеній и спинного мозга.

Случайную причину болѣзни преимущественно приписываютъ употребленію хлѣба съ рожками. Въ продолженіе эпидеміи, которую наблюдалъ *Берендсъ*, неупотреблявшіе рожковъ были пощажены ею (*).

Болѣзнь, которую слѣдилъ Г-нъ *Чудновскій* въ Вятской Губерніи, составляетъ корчечное опличеніе *Raphaniæ*; а форма, описанная Г-номъ *Божновскимъ*, есть *necrosis ustilaginea*. Г-нъ *Ч.* вовсе не говоритъ о томъ особенномъ зудѣ (отъ чего и Нѣмецкое названіе: *Kriebelkrankheit*), похожемъ на ползаніе муравьевъ подъ кожей (*sensus formicationis*), который не только въ конечностяхъ, но иногда на всемъ пространствѣ тѣла подъ кожей и даже въ языкѣ былъ замѣченъ. Г-нъ *Б.* замѣ-

(*) *Most* l. c.

пиль эшошь зудъ только у весьма немногихъ. Наблюдавшіе сію болѣзнь въ другихъ мѣстахъ упоминають о необыкновенной прожорливости (*bulimos*), оказывавшейся у нѣкоторыхъ больныхъ; они видѣли, что болѣзнь облегчалась иногда рвотой, при чемъ выходила вязкая слизь, а верѣдко волосообразныя (*) (*Trichocephalus dispar*) и круглыя глисты (*Ascaris lumbricoides*); иногда замѣчено было рѣшеніе болѣзни крипическими сыпями (*scabie, febrimiliagi*, нарывами и сливопеченіемъ. — Г-нъ *Б.* и Г-нъ *Ч.* умалчивають объ эшихъ явленіяхъ.

Жаль, что оба Врача не предспавили никакихъ наблюденій надъ трупами. Желательно было бы знать: шакъ ли скоро трупы умершихъ переходяшъ въ гнидосць, какъ нѣкоторые замѣшили (**), и какія пе-

(*) Основываясь на семъ явленіи и на шомъ, что въ трупахъ умершихъ *ex Raphania*, встрѣчали *trichocephalos*, нѣкоторые, весьма несправедливо, приписывали эшимъ глистамъ причину болѣзни. Смотри *Conradi* въ прив. соч. § 1271.

(**) *Puchelt* въ прив. соч. § 1167.

ремьны могли воспрѣшиться въ тѣлѣ по вскрышнѣ.

Болезнь эта чаще поражаетъ мужчинъ, нежели женщинъ и дѣтей (*); это подтверждаютъ и наблюденія Г-на Б. Въ числѣ больныхъ его находились только два мальчика, одинъ 9, а другой 11 лѣтъ; прочіе больные были люди взрослые, большею частію, мужскаго пола, иные за 40 лѣтъ, и одинъ имѣвшій 55 лѣтъ опъ роду. Наблюденія другаго рода представлялъ Докт. Вагнеръ (**), видѣвшій сію болезнь въ Германіи (въ 1831 и 1832 г.); онъ увѣряетъ, что большая часть больныхъ его имѣли возрастъ опъ 4 — 14 лѣтъ; болезнь рѣдко воспрѣчалась у людей, имѣвшихъ за 20 лѣтъ; люди, бывшіе выше 50 лѣтъ, вовсе не поражались ею. Болезнь щадитъ грудныхъ младенцевъ: »Tametsi nemo fere non, praeter infantes lactantes, eidem subjectus est.«
К. А. Vogel въ прив. соч. §. 494.

(*) *Puchelt* 1. с. §. 1162.

(**) *Bluff* Leistungen und Fortschritte der Medizin in Deutschland im Jahre 1832. Стр. 155 и слѣд. Военно-Медиц. Журн. Ч. XXIII. No. 2. стр. 256 и слѣд.

Замѣчательно, что *Raphania*, оказавшаяся въ Вишской Губерніи въ видѣ злой корчи, сопровождалась значительною смертносію; между тѣмъ какъ сухой аншоновъ огонь, бывшій въ Войскѣ Донскомъ, имѣлъ, болѣею частію, благопріятный исходъ.

Если болѣзнь, въ обоихъ своихъ видахъ, должна бытъ приписана рожкамъ: что почему въ одномъ случаѣ она является преимущественно корчевымъ состояніемъ, а въ другомъ — аншоновымъ огнемъ?

Пораженіе конечностей аншоновымъ огнемъ замѣчено и при врачебномъ употребленіи *Secalis cornuti*; но случаи сего рода рѣдки. Одинъ изъ шаковыхъ описавъ въ *Gazette medicale* No. 43. 1832. Это была женщина 32 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложенія; ей дано было, для возбужденія родовыхъ попугъ, обыкновенное количество *Secalis cornuti*. Въ слѣдствіе сего, какъ увѣряющъ, оказалась *gangraena extremitatis inferioris dextri*, кончившаяся смертію.

Что такое рожки? Какимъ образомъ они происходятъ (*)? На эти вопросы трудно

(*) Смощ. О свойствахъ, химическихъ качествахъ, про-

дать отвѣсы, вполнѣ удовлетворительныя. Весьма вѣроятно, что рожки составляютъ особенную болѣзнь, свойственную нивянымъ распеніямъ и наипаче колосьямъ ржи. Ежегодно встрѣчаешь рожки тамъ и сямъ въ поствѣ; но въ большомъ количествѣ являюся они во время постоляно-сырой погоды.

Вѣроятно также, что дѣйствіе рожковъ опредѣляется совокупностію многихъ обстоятельствъ. Сюда отнести должно: количество рожковъ, ихъ качество и свѣжестъ, состояніе атмосферы и самую привычку. Принявъ эти обстоятельства въ соображеніе, сдѣлается понятнымъ, почему употребленіе рожковъ иногда не сопровождается замѣчательными дѣйствіями на пѣло наше. Въ

исхожденіи и дѣйствіи рожковъ на животно. организмъ (извлеч. изъ Нѣмецк. сочиненія *Дюца*), Военно-Медицин. Журн. Ч. XXV. No. 1. стр. 100 и слѣд. Много любопытнаго по сему предмету представилъ *Schwartz* въ своихъ *Pharmacologische Tabellen*. 1853. стр. 460 и слѣд. Много поучительнаго, въ семъ отношеніи, находимся въ занимательной спашь Г. Професс. *Хотовицкаго*: О жизненныхъ припасахъ, какъ предметъ Медиц. Полиціи; смотр. Военно-Медицин. Журн. Ч. XIV. No. 1.

семь смыслъ поучительно наблюдение *Яна* (*), и въ особенноти замѣчашеленъ примѣръ, разсказанный *Блуффомъ* (**)

Вагнеръ говоритъ (I. с.), что лучшая предохранительная мѣра противъ сей болѣзни, со стороны Царивельства, должна состоять въ уничтоженіи всего количества вреднаго хлѣба, въ inomъ округѣ, гдѣ оказалась *Raphania*, и въ замѣнѣ его подвозомъ здороваго. Всѣ другія мѣры, по его мнѣнію, ненадежны къ усраненію болѣзни.

Въ первомъ періодѣ болѣзни всѣ писатели похваляютъ приличныя рвошныя и слабительныя средства. Въ послѣдствіи болѣзнь лечится сообразно выходящимъ припадкамъ; въ семъ смыслѣ *peruina* наипаче полезны. Общее и мѣстное кровопусканіе назначаются только по особеннымъ требованіямъ. »*Fortassis*, говоритъ *R. A. Vogel* (I. с. стр. 104), *etiam lac tanquam summum antidotum ad curationem prodest, quum infantes lactantes a morbo immunes manent.*» *Ammonium carbonicum* съ пользою давали при опривленіи рожкамн. Французскій Врачъ *Cour-*

(*) *Most*, I. с.

(**) I. с. стр. 157.

hant назначалъ это средство внутрь (in infuso chinæ) и снаружи; въ продолженіе двухъ часовъ своего употребленія, оно укрощало судороги и препятствовало развитію англонова огня въ конечностяхъ (*). Аммоніумъ carbonicum заслуживаетъ, чтобы его чаще назначали in Rarhania epidemica.

(*) *Schwartz* l. c. Стр. 463.